

# Vaccination COVID-19 chez patients avec histoire d'allergie

- Allergies alimentaires
- Allergies aux venins d'insectes
- Allergies aux médicaments (incluant chimiothérapie et produits de contraste radiologiques)
- Allergies respiratoires
- Urticaire chronique
- Dermatite de contact
- Réaction d'allure allergique plus d'une heure après l'administration de vaccins (tous types de vaccins incluant vaccins COVID-19)

Vaccination régulière dans la population générale

Histoire d'allergie immédiate (< 1 heure après l'administration) à tous les vaccins anti-infectieux contenant polysorbate (incluant les vaccins anti-grippaux)\*

Vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna (ARN messenger)

Vaccination régulière avec observation 30 minutes

-Réaction allergique immédiate (< 1 heure après l'administration de vaccin COVID-19)

-Réaction allergique « SÉVÈRE » dans les 24 heures après l'administration du vaccin COVID-19

Doit être rapporté à la santé publique pour évaluation initiale

Réaction légère

Anaphylaxie

Diriger vers un allergologue pour évaluation

Histoire d'allergie au polyéthylène glycol (PEG)

\* cf liste jointe

Vaccins contenant du polysorbate :	Vaccins ne contenant pas de polysorbate :
<p> Infanrix-IPV  Infanrix-IPV-Hib  Infanrix hexa  Quadracel  Pédiacel  Adacel-polio  (Sabin oral)  Boostrix  Boostrix-polio  Hépatite A-typ 1  Shingrix  Imovax-polio  Havrix  Twinrix  Trumenba  Pevnar 13  Rotateq  TCT  Gardasil 9  Agriflu  Fluad  Flucelvax quad  Flulavaltetra  Fluviral  Influvac tetra </p>	<p> Yf-vax  Ixiaro  Cervarix  Varilrix  Varivax  Priorix tetra  Proquad  Imovax  Rabavert  Synflorix  Acthib  Hiberix  Adacel  Td adsorbé  Rotarix  MMR-2  Priorix  Flumist  Menjugate  Neisvac  Nimenrix  Menactra  Menveo  Bexero  Recombivax  Engerix B  Vaqta  Avaxim  Pneumo 23  <u>BCG</u>  dukoral  typhim  vivotif  zostavax  agriflu tetra  fluzone HD  fluzone quadrivalent </p>

Date 2021-04-27