

Éluxadoline (Viberzi)

Nouveau traitement du syndrome du côlon irritable avec diarrhée

Santé Canada a approuvé l'utilisation du premier produit d'une nouvelle classe de médicaments indiquée pour le traitement du syndrome du côlon irritable avec diarrhée (SCI-D) chez l'adulte, une maladie pour laquelle il existe très peu d'options thérapeutiques. L'éluxadoline (Viberzi), commercialisée par Allergan, atténue la diarrhée et les douleurs abdominales.

Le syndrome du côlon irritable se caractérise par des malaises ou des sensations douloureuses au ventre. On distingue trois catégories : syndrome avec douleur et diarrhée (SCI-D); syndrome avec douleur et constipation; syndrome avec douleur, diarrhée et constipation.

Les personnes atteintes de SCI-D sont incommodées par des épisodes fréquents de diarrhée pressante, de ballonnements, de crampes et de douleurs abdominales. Elles peuvent soulager leurs symptômes à l'aide de médicaments de vente libre comme la lopéramide (Imodium), mais il est alors possible que la douleur abdominale augmente. Dans le cadre de deux études de phase III menées auprès de 2 425 adultes du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni, l'éluxadoline a entraîné une atténuation de la douleur abdominale et de la diarrhée en une à quatre semaines suivant le début de la prise du médicament. Le soulagement des symptômes s'est prolongé tout au long de ces études, d'une durée de 26 semaines et de 52 semaines respectivement (Lembo et al., 2016).

Les principaux critères sur lesquels se sont basés les chercheurs afin d'évaluer l'efficacité du produit étaient une amélioration de la douleur abdominale et de la consistance des selles durant la même journée, pendant au moins 50 % des journées de l'étude. « Dans les essais cliniques, Viberzi a permis d'améliorer la consistance des selles de manière plus manifeste qu'il a permis d'atténuer la douleur abdominale », précise toutefois le fabricant dans la monographie du produit (Allergan, 2017).

L'éluxadoline fait partie de la nouvelle classe des agonistes des récepteurs des opiacés μ /antagonistes des récepteurs

Tableau 1 Contre-indications

- Obstruction connue ou soupçonnée des canaux biliaires, ou maladie ou dysfonction du sphincter d'Oddi
- Absence de vésicule biliaire
- Alcoolisme ou consommation d'alcool excessive
- Antécédents de pancréatite, maladies structurelles du pancréas ou obstruction connue ou soupçonnée du canal pancréatique
- Insuffisance hépatique grave
- Antécédents de constipation chronique ou grave
- Prise concomitante d'inhibiteurs puissants de l'OATP1B1 (p. ex. : cyclosporine)

des opiacés δ , qui agit sur les récepteurs locaux dans le tractus gastro-intestinal.

Effets indésirables

L'éluxadoline étant un opiacé, il peut créer une dépendance psychologique ou une toxicomanie. Le médicament peut aussi induire de la somnolence, des étourdissements et de la constipation. Le médicament est contre-indiqué chez les personnes présentant les situations énumérées au **Tableau 1**.

Posologie et coût

La dose recommandée est de 100 mg deux fois par jour po, à prendre avec de la nourriture. Chez les patients qui ne tolèrent pas la dose de 100 mg, on optera pour celle de 75 mg deux fois par jour. Le médicament est vendu 2,21 \$ le comprimé, auxquels s'ajoutent les honoraires du pharmacien. ■ **G.S.**

Référence

Allergan. (26 janv. 2017). Monographie de produit. Viberzi, éluxadoline [Communiqué de presse]. Repéré à <https://allergan-web-cdn-prod.azureedge.net/allergan-canada-specialty/allergan-canada-specialty/media/actavis-canada-specialty/fr/products/pms/2017-01-26-viberzi-pm-french.pdf>

Lembo, A. J., Lacy, B. E., Zuckerman, M. J., Schey, R., Dove, L. S., Andrae, D. A., ... Covington, P. S. (2016). Eluxadoline for irritable bowel syndrome with diarrhea. *The New England Journal of Medicine*, 374(3), 242-253. <http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1505180>